



ינואר 2026

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה ,

חברת טבע מודיעה על העדכונים הבאים בעלון לצרכן של התכשיר:

FAMPRIDINE TEVA 10 MG

פמפרידין טבע 10 מ"ג

כל טבלייה מכילה 10mg Fampridine :

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

Fampridine Teva is indicated for the improvement of walking in adult patients with multiple sclerosis with walking disability (EDSS 4-7)

העלון לרופא והעלון לצרכן עודכנו. בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד. תוספות מידע מסומנות באדום והחמרות **בצהוב** :

טבע ישראל בע"מ

רח' התאנה 1, פארק תעשייה חמ"ן ת.ד. 975, שוהם 6085001 | טל: 972-3-6864000 | www.tevapharm.com

1. למה מיועדת התרופה?

[...]

קבוצה תרפויטית:

איזומר של פירידין, חוסם תעלות אשלגן תרופות אחרות למערכת העצבים.

[...]

פמפרידין טבע ככל הנראה מאפשרת ובכך מאפשרת מעבר סיגנלים תקין יותר בנוירונים וכך משפרת את יכולת ההליכה ומתאפשר שיפור בהליכה

לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל לפמפרידין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").

[...]

[...]

- אל תיקח פמפרידין טבע אם אתה לוקח תרופה אחרת המכילה פמפרידין.
- תרופות אחרות אשר משפיעות על הכליות. הרופא שלך ינהג במשנה זהירות כאשר פמפרידין ניתן באותו הזמן עם תרופות תרופה מסוימות מסוימת העלולות העלולה להשפיע על פינוי תרופות על ידי הכליות, כגון קרבדילול, פרופרנולול ומטפורמין.

שימוש בתרופה בפמפרידין טבע ומזון

יש ליטול את התרופה פמפרידין טבע ללא אוכל, על קיבה ריקה.

היריון, הנקה ופוריות

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שיתכן שאת בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, יש לספר על כך לרופא לפני השימוש בפמפרידין טבע.

[...]

3. כיצד תשתמש בתרופה?

[...]

אין ליטול את הטבליטות בתדירות גבוהה יותר מאשר כל 12 שעות פמפרידין טבע מיועדת לשימוש פומי (בליעה)

[...]

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, עליך לפנות מיד לרופא. הסימנים של מינון יתר כוללים: הזעה, רעידות רעד קל, בלבול, איבוד זיכרון ופרוסים. אתה עלול להבחין גם בתופעות אחרות שלא צוינו כאן להלן. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה. יש להמתין תמיד 12 שעות בין נטילת כל טבלייה לבאה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והימנע ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

[...]

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה, השפעתה המיטיבה תפוג.

טיפול לא רציף עלול לגרום לאי קבלת התוצאה הרצויה. טרם ההפסקה, יש לדון עם הרופא בהשלכות.

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

רח' התאנה 1, פארק תעשייה חמ"ן ת.ד. 975, שוהם 6085001 | טל: 972-3-6864000 | www.tevapharm.com

4. תופעות לוואי

[...]

יש להפסיק את השימוש ולפנות מייד לרופא, אם אתה סובל מפרוסים או אם אתה סובל מאחד או יותר מהסימנים הבאים של **אלרגיה** (רגישות יתר): נפיחות בפנים, בפה, בשפתיים, בגרון או בלשון; אדמומיות או עקצוצים בעור; לחץ בחזה או קשיי נשימה.

[...]

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

[...]

• **זיהום ויראלי**

• קושי נשימה (קוצר נשימה)

[...]

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

• פרוסום

• **רגישות יתר** (אלרגיה) תגובה אלרגית (רגישות יתר)

• **נפיחות בפנים**, שפתיים, פה או לשון (אנג'דמה)

• **אלרגיה קשה** (תגובה אנאפילקטית)

• **הופעה חדשה או החמרה בכאב של כאב** עצבי בפנים (trigeminal neuralgia)

• **דופק מהיר** (טכיקרדיה)

• **סחרחורות או אובדן הכרה** (לחץ דם נמוך)

• **פריחה/פריחה מגדלת** (אורטיקריה)

• **אי נוחות בחזה**