

מרץ 2026

Nebido®

נבִידו

testosterone undecanoate 250 mg/ml: **מרכיב פעיל:**

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,
חברת ניאופרם (ישראל) 1996 בע"מ מבקשת להודיע על עדכון העלונים לרופא והעלונים לצרכן של התכשיר שבנדון. העלונים עודכנו בפברואר 2026.

ההתוויה הרשומה לתכשיר בישראל:
Testosterone replacement therapy in primary and secondary male hypogonadism.

מקראה לעדכונים המסומנים:
תוספת -כתב **כחול על רקע צהוב**
הסרה – כתב **אדום עם קו חוצה**
עדכונים נעשו בסעיף הבא בעלון לצרכן:

...
(2) לפני השימוש בתרופה
...
אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות
...
• תרופות לטיפול בסוכרת. ייתכן שיהיה צורך להתאים את המינון של התרופה להורדת הסוכר בדם. כמו אנדרוגנים אחרים, טסטוסטרון עלול להגדיל את ההשפעה של אינסולין. **נטילת מעכבי SGLT-2 (כגון אמפגליפלוזין, דפגליפלוזין או קנגליפלוזין) יחד עם טסטוסטרון עלולה להגביר את מספר תאי הדם האדומים בדם. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לעקוב אחר בדיקות הדם בתדירות גבוהה יותר.**
...

עדכונים נעשו בסעיף הבא בעלון לרופא:

...
4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction
...
Insulin and other anti-diabetic
Androgens may improve glucose tolerance and decrease the need for insulin or other anti-diabetic medicines in diabetic patients (see section 4.4). Patients with diabetes mellitus should therefore be monitored especially at the beginning or end of treatment and at periodic intervals during Nebido treatment.
Concomitant use of testosterone replacement therapy and sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT-2) inhibitors has been associated with an increased risk of erythrocytosis. Since both substances may independently elevate haematocrit levels, a cumulative effect is possible (see also section 4.4). Monitoring of haematocrit and haemoglobin levels is recommended in patients receiving both treatments.
...

העלונים לרופא והעלונים לצרכן נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לבעל הרישום ניאופרם (ישראל) 1996 בע"מ, בנין ניאופרם, רחוב השילוח 6 ת.ד. 7063 פתח תקוה 4917001, טלפון: 03-9373737, פקס: 03-9373770.

בברכה,

אבי ילצינדג

רוקח ממונה