

שם מסחרי, חוזק והחומר הפעיל	הגיל בהתוויה המאושרת	מינון מקובל	מה באריזה	מנגנון הפעולה	דרך מתן	התוויות נגד	תופעות לוואי עיקריות	תגובות בין תרופתיות עיקריות	הוראות איחסון	מידע נוסף
Wegovy 0.25 mg semaglutide (Novo Nordisk)	מבוגרים ומתבגרים בני 12 ומעלה	מינון התחלתי: 0.25 מ"ג פעם בשבוע למשך 4 שבועות. לאחר סכן ניתן להעלות את המינון בהדרגה כל ארבעה שבועות ל-0.5 מ"ג, 1 מ"ג, 1.7 מ"ג ועד 2.4 מ"ג פעם בשבוע.	האריזה מכילה עט סוכן לשימוש 4-1 מחטים חד-פעמיות.	אנלוג לפפטיד דמוי גלוקאגון-1 (GLP-1)	הזרקה תת-עורית	רגישות לחומר הפעיל או למרכיבים נוספים.	בחילות, הקאות, שלשול, עצירות, כאב בטן, כאבי ראש, תחושת חולשה או עייפות.	במסופלים עם סוכרת שנוטלים תרופות לסוכרת מסמפחת סולפונילאוריאה או אינסולין - ייתכן ויהיה צורך להתאמת מינון לתרופות אלו.	לפני השימוש הראשון: יש לשמור במקרר (2°C-8°C), אסור להקפיא. במהלך השימוש: לשמור את העט במשך 6 שבועות כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-30°C או במקרר (2°C-8°C), אסור להקפיא.	קיים ניסיון מועט בקשישים מגיל 85 ומעלה, במסופלים עם מחלת כליות קשה או עם מחלת כבד חמורה. התרופה איננה מאושרת לשימוש בהריון והנקה. נשים בגיל הפוריות צריכות גם להימנע משימוש בהריון וייעל ספני היריון. אם אישה מתכננת הריון עליה להפסיק את השימוש בתרופה לפחות חודשיים לפני הניסיון להרות. אין להשתמש בתרופה אם ידועה היסטוריה משפחתית או אישית של סרטן בבלוטת התריס ססוג גדוליה או גידולים נאונדוקרינים (MEN2). השימוש בוגובי יכול גם לסייע במניעת מחלת לב. במהלך הטיפול בתרופה יש להקפיד על שתיית נוזלים ולהימנע מהתייבשות.

Wegovy 1 mg	מבוגרים ומתבגרים בני 12 ומעלה	מינון התחלתי: 0.6 מ"ג פעם ביום למשך 4 שבועות. לאחר סכן ניתן להעלות את המינון בהדרגה כל שבוע ל-1.2 מ"ג, 1.8 מ"ג, 2.4 מ"ג ועד למינון מקסימלי של 3.0 מ"ג פעם ביום.	האריזה מכילה 1, 3 ו-5 עטים המכונים לשימוש. עט אחד סכיל 18 מ"ג לירגלוטיד. מחטים אינן כלולות באריזה.	אנלוג לפפטיד דמוי גלוקאגון-1 (GLP-1)	הזרקה תת-עורית	רגישות לחומר הפעיל או למרכיבים נוספים.	בחילות, הקאות, שלשול, עצירות, כאב ראש.	במסופלים עם סוכרת שנוטלים תרופות לסוכרת מסמפחת סולפונילאוריאה או אינסולין - ייתכן ויהיה צורך להתאמת מינון לתרופות אלו.	לפני השימוש הראשון: יש לשמור במקרר (2°C-8°C), אסור להקפיא. במהלך השימוש: לשמור את העט במשך 6 שבועות כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-30°C או במקרר (2°C-8°C), אסור להקפיא.	קיים ניסיון מועט בקשישים מגיל 75 ומעלה, במסופלים עם מחלת כליות קשה או עם מחלת כבד חמורה. התרופה איננה מאושרת לשימוש בהריון והנקה. נשים בגיל הפוריות צריכות גם להימנע משימוש בהריון וייעל ספני היריון. אם אישה מתכננת הריון עליה להפסיק את השימוש בתרופה לפחות חודש לפני הניסיון להרות. אין להשתמש בתרופה אם ידועה היסטוריה משפחתית או אישית של סרטן בבלוטת התריס ססוג גדוליה או גידולים נאונדוקרינים (MEN2). השימוש בוגובי יכול גם לסייע במניעת מחלת לב. במהלך הטיפול בתרופה יש להקפיד על שתיית נוזלים ולהימנע מהתייבשות.
--------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------	----------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שם מסחרי, חוזק והחומר הפעיל	הגיל בהתוויה המאושרת	מינון מקובל	מה באריזה	מנגנון הפעולה	דרך מתן	התוויות נגד	תופעות לוואי עיקריות	תגובות בין תרופתיות עיקריות	הוראות איחסון	מידע נוסף
Saxenda 6 mg/ml (liraglutide) (Novo Nordisk)	מבוגרים ומתבגרים בני 12 ומעלה	מינון התחלתי: 0.6 מ"ג פעם ביום למשך 4 שבועות. לאחר סכן ניתן להעלות את המינון בהדרגה כל שבוע ל-1.2 מ"ג, 1.8 מ"ג, 2.4 מ"ג ועד למינון מקסימלי של 3.0 מ"ג פעם ביום.	האריזה מכילה עט אחד כולל 4 סנות, ומגיעה ללא מחטים, יש לרכוש מחטים בנפרד. יש לבצע אתחול בכל הזרקה - כמות קטנה של תרופה עשויה להישאר בעט לאחר שכל ארבע הסנות ניתנו כראוי. אין לנסות להשתמש בנוזל שנותר, סאחר וסדובר בכמות קטנה שנותרה מלכתחילה כעודף שתוכן על סנת לזרז את תהליך האתחול.	אנלוג משולב לפפטיד דמוי גלוקאגון (GLP-1) ופולפפטיד אינסולין-רופי תלי גלוקוז (GIP)	הזרקה תת-עורית	רגישות לחומר הפעיל או למרכיבים נוספים.	בחילה, שלשול, כאבי בטן, הקאות וצירות.	במסופלים עם סוכרת שנוטלים תרופות לסוכרת מסמפחת סולפונילאוריאה או אינסולין - ייתכן ויהיה צורך להתאמת מינון לתרופות אלו. במסופלים הנוטלים תרופות דרך הפה בעלות סדר טיפולי צר (למשל, וורפרין, דיגוקסין), מומלץ לנסר את הטיפול במיוחד בתחילת הטיפול בטרופטיד ולאחר העלאת המינון.	לפני השימוש הראשון: יש לשמור במקרר (2°C-8°C), אסור להקפיא. במהלך השימוש: לשמור את העט במשך 6 שבועות כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורה של עד 30°C. לאחר סכן יש להשליך את העט.	קיים ניסיון מועט בקשישים מגיל 85 ומעלה, במסופלים עם מחלת כליות קשה או עם מחלת כבד חמורה. התרופה איננה מאושרת לשימוש בהריון והנקה. נשים בגיל הפוריות צריכות גם להימנע משימוש בהריון וייעל ספני היריון. אם אישה מתכננת הריון עליה להפסיק את השימוש בתרופה לפחות חודש לפני הניסיון להרות. באשר להנקה, התרופה עוברת לחלב אם בכמויות מאוד נמוכות ולא צפויה להיפסק אצל התינוק הינק. ניתן לשקול שימוש במהלך ההנקה, בהתאם לשיקול דעת רפואי. אין להשתמש בתרופה אם ידועה היסטוריה משפחתית או אישית של סרטן בבלוטת התריס ססוג גדוליה או גידולים נאונדוקרינים (MEN2). השימוש בוגובי יכול גם לסייע במניעת מחלת לב. במהלך הטיפול בתרופה יש להקפיד על שתיית נוזלים ולהימנע מהתייבשות.

שם מסחרי, חוזק והחומר הפעיל	הגיל בהתוויה המאושרת	מינון מקובל	מה באריזה	מנגנון הפעולה	דרך מתן	התוויות נגד	תופעות לוואי עיקריות	תגובות בין תרופתיות עיקריות	הוראות איחסון	מידע נוסף
Mounjaro 2.5 mg Tirzepatide (Eli Lilly)	מבוגרים ומתבגרים מגיל 18 ומעלה	מינון התחלתי: 2.5 מ"ג פעם בשבוע. לאחר 4 שבועות, יש להעלות את המינון ל-5 מ"ג פעם בשבוע. במידת הצורך, ניתן לבצע העלאת מינון של 2.5 מ"ג, לאחר לפחות 4 שבועות במינון הנוכחי. מינון אחזקה מומלצים: 5, 10 ו-15 מ"ג. 15 מ"ג פעם בשבוע.	האריזה מכילה עט אחד כולל 4 סנות, ומגיעה ללא מחטים, יש לרכוש מחטים בנפרד. יש לבצע אתחול בכל הזרקה - כמות קטנה של תרופה עשויה להישאר בעט לאחר שכל ארבע הסנות ניתנו כראוי. אין לנסות להשתמש בנוזל שנותר, סאחר וסדובר בכמות קטנה שנותרה מלכתחילה כעודף שתוכן על סנת לזרז את תהליך האתחול.	אנלוג משולב לפפטיד דמוי גלוקאגון (GLP-1) ופולפפטיד אינסולין-רופי תלי גלוקוז (GIP)	הזרקה תת-עורית	רגישות לחומר הפעיל או למרכיבים נוספים.	בחילה, שלשול, כאבי בטן, הקאות וצירות.	במסופלים עם סוכרת שנוטלים תרופות לסוכרת מסמפחת סולפונילאוריאה או אינסולין - ייתכן ויהיה צורך להתאמת מינון לתרופות אלו. במסופלים הנוטלים תרופות דרך הפה בעלות סדר טיפולי צר (למשל, וורפרין, דיגוקסין), מומלץ לנסר את הטיפול במיוחד בתחילת הטיפול בטרופטיד ולאחר העלאת המינון.	לפני השימוש הראשון: יש לשמור במקרר (2°C-8°C), אסור להקפיא. במהלך השימוש: לשמור את העט במשך 6 שבועות כאשר הוא מאוחסן בטמפרטורה של עד 30°C. לאחר סכן יש להשליך את העט.	קיים ניסיון מועט בקשישים מגיל 85 ומעלה, במסופלים עם מחלת כליות קשה או עם מחלת כבד חמורה. התרופה איננה מאושרת לשימוש בהריון והנקה. נשים בגיל הפוריות צריכות גם להימנע משימוש בהריון וייעל ספני היריון. אם אישה מתכננת הריון עליה להפסיק את השימוש בתרופה לפחות חודש לפני הניסיון להרות. באשר להנקה, התרופה עוברת לחלב אם בכמויות מאוד נמוכות ולא צפויה להיפסק אצל התינוק הינק. ניתן לשקול שימוש במהלך ההנקה, בהתאם לשיקול דעת רפואי. אין להשתמש בתרופה אם ידועה היסטוריה משפחתית או אישית של סרטן בבלוטת התריס ססוג גדוליה או גידולים נאונדוקרינים (MEN2). השימוש בוגובי יכול גם לסייע במניעת מחלת לב. במהלך הטיפול בתרופה יש להקפיד על שתיית נוזלים ולהימנע מהתייבשות.

שם מסחרי, חוזק והחומר הפעיל	הגיל בהתוויה המאושרת	מינון מקובל	מה באריזה	מנגנון הפעולה	דרך מתן	התוויות נגד	תופעות לוואי עיקריות	תגובות בין תרופתיות עיקריות	הוראות איחסון	מידע נוסף
Xenical 120 mg Orlistat (Tzamal Bio-Pharma)	מבוגרים ומתבגרים מגיל 12 ומעלה	120 מ"ג עד 3 פעמים ביום	הכמוסות מסודרות באריזות מגש (בליסטר). כל מגש מכיל 21 כמוסות, סה"כ 84 כמוסות באריזה.	מעכב ליפאז, מפחית ספיגת שומנים מסערכת העיכול.	נטילה דרך הפה	רגישות לחומר הפעיל או למרכיבים הנוספים. או למרכיבים הנוספים. תסמונת ספיגה לקיחה רכנית במסערכת העיכול (Chronic malabsorption syndrome), כולל דיסליפידים ונשיים סניקות.	כאב ראש, כאב או אי-נוחות בבטן, צורך דחוף או טוהר בפעילות טעיים (ציאה), גזים עם הפרשה הפרשה שומנית, צואה שומנית או שומנית. צואה נוזלית, היפוגליקמיה (מופיע בחלק מהנאשים עם סוכרת ססוג 2).	לאורליסטס יש אינטראקציות עם תרופות כמו וורפרין, ציקלופורין, לובטירוקסין, איטרוידון, תרופות לטיפול בנשאי HIV, תרופות לאפילפסיה ותרופות לטיפול בדיכאון. אורליסטס עלולה לשנות את הפעילות של התרופות. למידע מלא יש לעיין בעלון הרפואי.	אין לאחסן מעל 25°C. יש להגן מפני לחות ואור.	יש ליטול עם ארוחה מאוזנת הכוללת כשליש קלוריות מסוקר שומני. התרופה פועלת רק בנכחות שומנים בתזונה, ולכן אם מדלגים על ארוחה או שארוחה נטולת שומן, אין ליטול אורליסטס. יש להימנע מצריכת סוזן המכיל שוזן בין ארוחות. לא קיים מידע על השימוש באורליסטס בהריון והנקה ולכן השימוש בתרופה אינו מומלץ בהריון והנקה. במקרים של שלשולים חמורים, כדי לא לפגוע ביעילות גלולות למניעת היריון, מומלץ להשתמש באמצעי מניעה נוסף.

שם מסחרי, חוזק והחומר הפעיל	הגיל בהתוויה המאושרת	מינון מקובל	מה באריזה	מנגנון הפעולה	דרך מתן	התוויות נגד	תופעות לוואי עיקריות	תגובות בין תרופתיות עיקריות	הוראות איחסון	מידע נוסף
Razin 15 mg Phentermine (CTS)	מבוגרים ומתבגרים מגיל 16 ומעלה	15 מ"ג פעם ביום	הכמוסות מסודרות באריזות מגש (בליסטר) של 10 כמוסות באריזה; 30 כמוסות באריזה.	סימפוטומיטי, מדכא תיאבון באמצעות השפעה נויראדרגית ודופאמינרגית.	נטילה דרך הפה	רגישות יתר לרכיבי התנשית, היריון.	ערנות יתר, הפרעות שינה, יובש בפה, כפיכרדיה, עליה בלחץ הדם, כאבי ראש והפרעות במערכת העיכול.	אין אינטראקציות בין תרופתיות ידועות. תיתכן השפעה של תרופות הגוררות להפרעה בתנועת טעי, כמו אפויאידים ונוגדי דיכאון טריציקליים. לא ידועה השפעה על ספיגת תרופות אחרות, אך מומלץ להפריד בנטילה.	יש לאחסן באריזה המקורית ובטמפרטורה החדר (15°C-25°C). שלא תעלה על 25°C.	יש ליטול כמוסה אחת, דבר ראשון ביום, בארוחת הבוקר. כך, התרופה לא תפגע בשנת הלילה. ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון. עפי"ן עלון התרופה יש להשתמש בפנטרמין 3 עד חודשיים, עם זאת ניתן להשתמש בתקופה מעבר ל-3 חודשים בהתאם לשיקול הרפואי. הגבלת משך הטיפול ל-3 חודשים אינה חלק מהתוויה התכשיך. לאור זאת, רישום התכשיך מעבר לתקופה זו אינו מהווה רישום סוחר להתוויה (off label). פנטרמין איננה מאושרת לשימוש בהריון והנקה. נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעיל מפני היריון. אם אישה מתכננת הריון עליה להפסיק את השימוש בתרופה לפני הניסיון להרות. פנטרמין אינה סיועדת בדרך כלל למבוגרים מעל גיל 65. שתיתית אלכוהול עלולה להגביר תופעות לוואי של מערכת העצבים המרכזית.

שם מסחרי, חוזק והחומר הפעיל	הגיל בהתוויה המאושרת	מינון מקובל	מה באריזה	מנגנון הפעולה	דרך מתן	התוויות נגד	תופעות לוואי עיקריות	תגובות בין תרופתיות עיקריות	הוראות איחסון	מידע נוסף
Epitomee (Rafael)	מבוגרים ומתבגרים מגיל 18 ומעלה	יש ליטול קפסולות 15 מ"ג פעם ביום	56 קפסולות	סימפוטומיטי, מדכא תיאבון באמצעות השפעה נויראדרגית ודופאמינרגית.	נטילה דרך הפה	רגישות יתר לרכיבי התנשית, היריון.	ערנות יתר, הפרעות שינה, יובש בפה, כפיכרדיה, עליה בלחץ הדם, כאבי ראש והפרעות במערכת העיכול.	אין אינטראקציות בין תרופתיות ידועות. תיתכן השפעה של תרופות הגוררות להפרעה בתנועת טעי, כמו אפויאידים ונוגדי דיכאון טריציקליים. לא ידועה השפעה על ספיגת תרופות אחרות, אך מומלץ להפריד בנטילה.	יש לאחסן במקורית ובטמפרטורה החדר (15°C-25°C). שלא תעלה על 25°C.	יש ליטול כמוסה אחת, דבר ראשון ביום, בארוחת הבוקר. כך, התרופה לא תפגע בשנת הלילה. ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון. עפי"ן עלון התרופה יש להשתמש בפנטרמין 3 עד חודשיים, עם זאת ניתן להשתמש בתקופה מעבר ל-3 חודשים בהתאם לשיקול הרפואי. הגבלת משך הטיפול ל-3 חודשים אינה חלק מהתוויה התכשיך. לאור זאת, רישום התכשיך מעבר לתקופה זו אינו מהווה רישום סוחר להתוויה (off label). פנטרמין איננה מאושרת לשימוש בהריון והנקה. נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעיל מפני היריון. אם אישה מתכננת הריון עליה להפסיק את השימוש בתרופה לפני הניסיון להרות. פנטרמין אינה סיועדת בדרך כלל למבוגרים מעל גיל 65. שתיתית אלכוהול עלולה להגביר תופעות לוואי של מערכת העצבים המרכזית.

שם מסחרי, חוזק והחומר הפעיל	הגיל בהתוויה המאושרת	מינון מקובל	מה באריזה	מנגנון הפעולה	דרך מתן	התוויות נגד	תופעות לוואי עיקריות	תגובות בין תרופתיות עיקריות	הוראות איחסון	מידע נוסף
Imcivree Setmelanotide (Medison)	מבוגרים ומתבגרים מגיל 12 ומעלה	מינון עולה בהדרגה בהתאם לגיל ומשקל הילד. בילדים מגיל 12 ומעלה, המינון ההתחלתי הוא 1 מ"ג פעם ביום. ההתחלת מעלים בהדרגה עד למינון מקסימלי של 3 מ"ג פעם ביום.	בבקבוק שקוף עם פקק ומכסה המכיל 10 מ"ג של סטמלנוטיד ב-1 מ"ל תמיסה עבור הזרקה.	אנלוגיט קולטן MC4 נמוך ובכך מסייע בביסות רעב ואיזון אנרגטי.	הזרקה תת-עורית	רגישות לחומר הפעיל או לחומרים הלא פעילים.	אזורים או כתמים כהים על העור, כאב, חבורות או דלקת במקום ההזרקה, עייפות, כאב ראש, זקפת פין ספונגית או טוהר, נגיפים על העור, שלשול או עצירות.	לא ידועות	לפני השימוש הראשון: יש לשמור במקרר (2°C-8°C), אסור להקפיא. יש להגן מפני חיי סדף לאחר הפתיחה הראשונה: ניתן להשתמש למשך עד 30 ימים וניתן לאחסן בטמפרטורה של עד 30°C. לאחר סכן אין להשתמש בבקבוקונים.	קיים ניסיון מועט בקשישים מגיל 85 ומעלה, במסופלים עם מחלת כליות קשה או עם מחלת כבד חמורה. התרופה איננה מאושרת לשימוש בהריון והנקה. נשים בגיל הפוריות צריכות גם להימנע משימוש בהריון וייעל ספני היריון. אם אישה מתכננת הריון עליה להפסיק את השימוש בתרופה לפחות חודשיים לפני הניסיון להרות. אין להשתמש בתרופה אם ידועה היסטוריה משפחתית או אישית של סרטן בבלוטת התריס ססוג גדוליה או גידולים נאונדוקרינים (MEN2). השימוש בוגובי יכול גם לסייע במניעת מחלת לב. במהלך הטיפול בתרופה יש להקפיד על שתיית נוזלים ולהימנע מהתייבשות.

שם מסחרי, חוזק והחומר הפעיל	הגיל בהתוויה המאושרת	מינון מקובל	מה באריזה	מנגנון הפעולה	דרך מתן	התוויות נגד	תופעות לוואי עיקריות	תגובות בין תרופתיות עיקריות	הוראות איחסון	מידע נוסף
Melanocortin Receptor Agonist	מבוגרים ומתבגרים מגיל 12 ומעלה	מינון עולה בהדרגה בהתאם לגיל ומשקל הילד. בילדים מגיל 12 ומעלה, המינון ההתחלתי הוא 1 מ"ג פעם ביום. ההתחלת מעלים בהדרגה עד למינון מקסימלי של 3 מ"ג פעם ביום.	בבקבוק שקוף עם פקק ומכסה המכיל 10 מ"ג של סטמלנוטיד ב-1 מ"ל תמיסה עבור הזרקה.	אנלוגיט קולטן MC4 נמוך ובכך מסייע בביסות רעב ואיזון אנרגטי.	הזרקה תת-עורית	רגישות לחומר הפעיל או לחומרים הלא פעילים.	אזורים או כתמים כהים על העור, כאב, חבורות או דלקת במקום ההזרקה, עייפות, כאב ראש, זקפת פין ספונגית או טוהר, נגיפים על העור, שלשול או עצירות.	לא ידועות	לפני השימוש הראשון: יש לשמור במקרר (2°C-8°C), אסור להקפיא. יש להגן מפני חיי סדף לאחר הפתיחה הראשונה: ניתן להשתמש למשך עד 30 ימים וניתן לאחסן בטמפרטורה של עד 30°C. לאחר סכן אין להשתמש בבקבוקונים.	קיים ניסיון מועט בקשישים מגיל 85 ומעלה, במסופלים עם מחלת כליות קשה או עם מחלת כבד חמורה. התרופה איננה מאושרת לשימוש בהריון והנקה. נשים בגיל הפוריות צריכות גם להימנע משימוש בהריון וייעל ספני היריון. אם אישה מתכננת הריון עליה להפסיק את השימוש בתרופה לפחות חודשיים לפני הניסיון להרות. אין להשתמש בתרופה אם ידועה היסטוריה משפחתית או אישית של סרטן בבלוטת התריס ססוג גדוליה או גידולים נאונדוקרינים (MEN2). השימוש בוגובי יכול גם לסייע במניעת מחלת לב. במהלך הטיפול בתרופה יש להקפיד על שתיית נוזלים ולהימנע מהתייבשות.

אם הנך מזהה חוסר ידע וקושי בשימוש בעט ההזרקה, יש לידע את הצוות המטפל

עריכה: ד"ר קובי כהן, ד"ר ליאת ברזילי-יוסי, פרופ' דרור דיקר, גב' סיגל שפר-בנטון, ד"ר אורלי ססיר, ד"ר עינת גולדיק, ד"ר שרית טיון ומרג' אלי מרס

המידע סיועד לצוות רפואי בלבד והוא אינו מחליף את העלון הרופא ו/או היתיעות עם רופא מוסקר. להתוויה מלאה ואופן השימוש המאושר בישראל יש לעיין בעלון הרופא כפי שאושר ע"י משרד הבריאות.

מידע כללי על עטי ההזרקה

גודל המחט:

- קוטר המחט: 29-32G.
- ככל שהמספר עולה הקוטר קטן.
- 32G מתאים לגילאים הצעירים.
- אורך המחט: 6-4 ס"מ. בילדים מומלץ להשתמש במחטים הקצרות יותר.

הנחיות כלליות להזרקה נכונה

אתר ההזרקה: יש להזריק בהזרקה תת עורית בלבד, SC, לאזור הירך, הבטן או הזרוע.

ניתן להזריק באותו אזור בגוף בכל פעם, אולם רצוי להזריק באתר הזרקה שונה באותו האזור בכדי למנוע רגישות מוגברת ושינויים בעור ובזרקמת השוזן התת עורית, Lipodystrophy.

פעולת ההזרקה: היא לחיצה על הבוכנה ולא סיבוב הבוכנה!

מידע נוסף על הזרקה נכונה, מופיע בכל עלון לצרכן של עט הזרקה רשום.

עקרונות הטיפול בהשמנה

- היעד הטיפולי במחלת ההשמנה הוא קידום בריאות המטופלת, הפחתת סיבוכי המחלה וכן הפחתת משקל.
- חשוב להדגיש כי הפחתת המשקל אינה היעד הטיפולי היחיד!**
- מומלץ להסביר למטופלים את הצורך בהעלאת מינון הדרגתית והימנעות מעליה במהירות.
- חשוב להקפיד על מעקב תזונתי סדיר, שתיתית מים במהלך היום, הימנעות מהתייבשות וכן תזונה עשירה בחלבון.
- בתרופות בהזרקה: זריקה ראשונה מומלצת בהדרגת אש צוות מקצועי כמו רופאה או אחות.
- נשים בגיל הפוריות:** ירידה במשקל עשויה לשפר את הפוריות ולהגביר את הסיכוי להרות. בנושים בגיל הפוריות שמשתמשות יעיל ספני היריון, בנושים שמתכננות הריון, מומלצת הפסקת התרופה בהתאם להמלצות היצרנים. בכל מקרה יש להיוועץ עם רופאת הנשים המטפלת.
- ילדים ומתבגרים:** בתרופות הרשומות לילדים ומתבגרים חשוב שהטיפול יינתן על ידי רופאה מומחית באנדוקרינולוגיה בילדים ובמסגרת מרפאה רב מקצועית לטיפול בהשמנה.

אם הנך מזהה חוסר ידע וקושי בשימוש בעט ההזרקה, יש לידע את הצוות המטפל

עריכה: ד"ר קובי כהן, ד"ר ליאת ברזילי-יוסי, פרופ' דרור דיקר, גב' סיגל שפר-בנטון, ד"ר אורלי ססיר, ד"ר עינת גולדיק, ד"ר שרית טיון ומרג' אלי מרס

המידע סיועד לצוות רפואי בלבד והוא אינו מחליף את העלון הרופא ו/או היתיעות עם רופא מוסקר. להתוויה מלאה ואופן השימוש המאושר בישראל יש לעיין בעלון הרופא כפי שאושר ע"י משרד הבריאות.