



אוגוסט 2026

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

חברת רז רוקחות מבקשת להודיעכם על עדכון העלון לרופא של התכשיר:

DOPAMINE HYDROCHLORIDE S.A.L.F. 40 MG/1 ML
דופמין הידרוכלוריד ס.א.ל.פ 40 מ"ג/1 מ"ל
CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION (I.V.)

המרכיב הפעיל:

DOPAMINE HYDROCHLORIDE 40 MG/1 ML

התוויה מאושרת:

DOPAMINE HYDROCHLORIDE S.A.L.F. is used for the treatment of states of shock of different nature:

- post myocardial infarction cardiogenic shock, a shock caused by a heart attack,
- surgical shock, caused by a surgical operation,
- hypovolemic or haemorrhagic shock, caused by a decrease in blood volume due to a hemorrhage,

A shock is characterized by a sharp decrease in blood pressure in response to a reduced blood flow in the organism.

בהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשו שינויים מהותיים בעלון לרופא. שינויים בעלון המהווים החמרה מודגשים ברקע צהוב, תוספות מסומנות בצבע אדום והשמטות מסומנות בקו אופקי. למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא המאושר.

העלון לרופא מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות (www.health.gov.il), וניתן גם לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום:

רז רוקחות בע"מ, רחוב גשר העץ 31, פארק תעשיות, עמק חפר ובטלפון 04-9079710.

בברכה,

רז רוקחות בע"מ



העדכונים המהותיים שבוצעו בעלון לרופא:

[...]

4.4 Special warnings and precautions for use

[...]

Interference with laboratory tests

Dopamine infusion suppresses the pituitary secretion of thyroid-stimulating hormone (TSH) and prolactin.

Do not add alkaline solutions to Dopamine Hydrochloride S.A.L.F. 40 mg/1 ml.

Dextrose solutions should be used with caution in patients with a history of subclinical or manifested diabetes mellitus.

Since the effect of dopamine is not known in case of reduced renal and hepatic function, in these patients careful monitoring is needed.

To avoid an inappropriate state of hypotension, dopamine infusion should be stopped gradually.

~~Keep the medicine out of the sight and reach of children.~~

For those engaged in sports activities: the use of this medicinal product without a therapeutic need constitutes doping and may result in positive anti-doping test results, even when used at therapeutic doses.

~~Warning to athletes: the use of this drug without therapeutic necessity constitutes doping; it may cause doping effects and positivity to anti-doping tests even with therapeutic doses.~~

[...]

4.8 Undesirable effects

[...]

From post-marketing experience with dopamine-containing medicinal products, the following adverse reactions have been reported:

fatal ventricular arrhythmias.

atrial fibrillation.

increased blood pressure.

mydriasis.

gangrene (serious or fatal gangrene of the feet has occurred following doses ranging from 10

micrograms/kg/min to 14 micrograms/kg/min, or higher, in some patients with pre-existing vascular disease).

[...]