# خطوة بخطوة

## كتيّب إرشادات لاستخدام هيكيوفيا باستخدام مضخة تسريب تمعّجية.
## معلومات إضافية بعد تلقي التوجيه من الفريق الطبي

**1.** هيكيوفيا مُسجَّلة كعلاج بديل للبالغين والأطفال والمراهقين (من 0 إلى 18 عامًا) الذين يعانون من:
متلازمات نقص المناعة الأولية مع ضعف إنتاج الأجسام المضادة

**2.** نقص المناعة الثانوي [Secondary immunodeficiencies (SID)] لدى المرضى الذين يعانون من:
- العدوى الخطيرة أو المتكررة
- عدم فعالية العلاج المضاد للميكروبات
- فشل مثبت في إنتاج أجسام مضادة محددة *(PSAF) أو مستوى IgG في المصل أقل من 4 جم/لتر.

*PSAF، عدم تحقيق زيادة بمقدار الضعف على الأقل في عيار الأجسام المضادة IgG ضد لقاحات المكورات الرئوية عديدة السكاريد ومستضدات متعددة الببتيد.

**3.** هيكيوفيا مُسجَّلة كعلاج مداومة مُعدِّل للمناعة للبالغين والأطفال والمراهقين (من 0 إلى 18 عامًا)
لدى المصابين باعتلال الجذور والأعصاب الالتهابي المزمن المزيل للميالين [Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP)]
بعد الاستقرار على العلاج بالغلوبيولينات المناعية الوريدية (IVIg).

*هذا الدليل مخصص للاستخدام بعد أن تلقّى المريض وصفة لـ HyQvia.
*هذا الدليل مكتوب بصيغة المذكر، ولكن محتواه يشير إلى الجنسين جميعًا.

HyQvia
Normal Immunoglobulin (Human) 10%
Recombinant Human Hyaluronidase

# مقدمة

## نظرة عامة على التسريب

لقد تم إعطاؤك دليل "خطوة بخطوة" هذا لأن اختصاصي الرعاية الصحية وصف لك أو للشخص الذي تعتني به علاجاً بـ HyQvia (فيما يلي: هيكيوفيا).
صُمم هذا الدليل لمساعدتك على استخدام هيكيوفيا باستخدام مضخة تسريب تَمعُجية.
استخدم هذا الدليل لإعطاء التسريب مباشرةً من القارورة.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف حول كيفية إعطاء هيكيوفيا أو علاج هيكيوفيا، فاتصل بطبيبك المعالج.

قم بإجراء التسريب وفقًا لتعليمات طبيبك المعالج، وبعد تلقي التدريب من الممرضة، وبعد قراءة المعلومات الواردة في نشرة العبوة.

من أجل تعلم كيفية إجراء تسريب هيكيوفيا بشكل مستقل، تقوم شركة تاكيدا إسرائيل المحدودة بتشغيل/تقديم برنامج دعم لمرضى هيكيوفيا يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تزويد المريض بمهارات التسريب الذاتي والمستقل في المنزل.
**للاتصال بممثل الشركة، اتصل على: 5015***

اسم ورقم هاتف أخصائي الرعاية الصحية:




HY = هيالورونيداز بشري مؤتلف
IG = غلوبولين مناعي بشري (IG بتركيز 10%)

## 5 خطوات لإعطاء هيكيوفيا عن طريق التسريب تحت الجلد

### .1
### التحضيرات المسبقة

- تحقّق من القوارير (الصلاحية/اللون)
- حضّر المعدات المطلوبة (انظر القائمة أدناه)
- اغسل يديك

### .2
### تحضير HY- (هيالورونيداز)

- اسحب HY إلى داخل المحقنة/المحاقن.
- قم بتوصيل أنبوب إبرة الإعطاء تحت الجلد بالمحقنة. (انظر الرسم التوضيحي أدناه)
- قم بضخ HY في أنبوب إبرة الإعطاء تحت الجلد لإخراج الهواء منه.

### .3
### تحضير IG

- قم بتوصيل مجموعة التسريب بقارورة IG.
- قم بتوصيل أنبوب التسريب بالمضخة.
- املأ أنبوب التسريب بـ IG لطرد الهواء منه باستخدام المضخة.

### .4
### تسريب هيكيوفيا

- قم بتوصيل مجموعة التسريب بقارورة IG.
- قم بتوصيل أنبوب التسريب بالمضخة.
- املأ أنبوب التسريب بـ IG لطرد الهواء منه باستخدام المضخة.

### .5
### الإنهاء

- انزع الإبرة.
- سجّل تفاصيل التسريب.


لا تُجر تسريب هيكيوفيا إلا بعد أن تتلقى التدريب من الطاقم الطبي وبعد قراءة المعلومات الواردة في النشرة للمستهلك.

# المعدات المطلوبة

في ما يلي المستلزمات اللازمة لإعطاء تسريب هيكيوفيا. قد تختلف التجهيزات التي لديك قليلاً.
****يُرجى ملاحظة أن المعدات التي تستخدمها لتسريب هيكيوفيا مخصصة للاستخدام مرة واحدة. يجب عدم إعادة استخدامها.**



تحتوي مجموعة هيكيوفيا على قارورتين:
HY.1
2. الغلوبولينات المناعية (IG)




مسحات كحول، وشريط لاصق، وضمادة نظيفة ومعقمة*



محقنة/محاقن سعة 20 و10 مل




اختياري:
أغطية طرفية معقمة (واحدة لكل محقنة)




إبرة الشفط



مجموعة إبرة للإعطاء تحت الجلد مع ضمادة معقمة



أنبوب تسريب مخصص للمضخة




مضخة تسريب تمعجية، سلك الطاقة، حامل للمضخة ودليل.
يمكنك تنزيل الدليل عبر الرابط:
eitanmedical.com/quick-guide-training



كيس محلول ملحي (محلول ملحي) لشطف أنبوب التسريب في نهاية العلاج



حاوية التخلّص من الأدوات الحادة




سجل توثيق العلاجات

*ارتدِ قفازات إذا طلب منك اختصاصي الرعاية الصحية ذلك.


# تركيب الأجزاء

أ





- قم بتوصيل المحقنة بإبرة الشفط
- أدخل المحقنة بالإبرة في قارورة HY
- افصل إبرة الشفط عن المحقنة سعة 20 مل
- قم بتوصيل محقنة HY بإبرة الإعطاء تحت الجلد.

ب




- قم بتوصيل إبرة الإعطاء تحت الجلد بمنطقة حقن مخصصة في الجسم.
- قم بالتسريب يدوياً (HY، الخطوة الأولى).

ج




- قم بتوصيل أنبوب التسريب بقارورة IG
- قم بتوصيل الأنبوب بالمضخة
- قم بتسريب IG باستخدام المضخة التمعجية (الخطوة الثانية)
- افصل أنبوب التسريب من قارورة IG ووصل الأنبوب بكيس تسريب لمحلول ملحي (saline)

الخطوة 1

# التحضيرات المسبقة





أخرج **هيكيوفيا** من العلبة.
افحص كل قارورة قبل الاستخدام:


- تاريخ انتهاء الصلاحية
- اللون: تأكد من أن السائل عديم اللون إلى أصفر باهت، وغير عكر، ولا يحتوي على أي جسيمات.
- سلامة غطاء الحماية الأرجواني.

اترك **هيكيوفيا** حتى الوصول إلى درجة حرارة الغرفة (قد يستغرق ذلك ما يصل إلى 60 دقيقة).
لا تستخدم أي وسائل تسخين، بما في ذلك الميكروويف.

- **لا تقم بتسخين هيكيوفيا أو رجّه.**




اجمع مستلزمات التجهيز اللازمة.




قم بإعداد سطح عمل نظيف.




اغسل يديك جيدًا.




افتح مستلزمات التجهيز كما أمرك الطبيب المعالج.

2

الخطوة 2


# تحضير HY

أ




أزل الغطاء. امسح السدادة المطاطية لكل قارورة **HY** بمسحة كحول واتركها تجف في الهواء لمدة 30 ثانية على الأقل.

ب





أخرج المحقنة المعقمة سعة 20 أو 10 مل* من العبوة وثبّتها بإبرة الشفط.

ج




اسحب المكبس لملء المحقنة بالهواء المعادل لحجم **HY**.

د



أدخل طرف الإبرة في وسط غطاء قارورة **HY**. ادفع الهواء إلى داخل القارورة.

هـ




اقلب القارورة على رأسها بحيث يكون طرف المحقنة مواجهًا لأعلى.
اسحب كل **HY** إلى داخل المحقنة.
كرر الخطوات من ج إلى هـ إذا كنت بحاجة إلى أكثر من قارورة واحدة من **HY** لجرعتك.
إذا لزم الأمر، استخدم محاقن إضافية.

نصيحة


قم بتغطية كل محقنة بغطاء طرفي معقم عند استخدام محاقن متعددة.

و



بعد نقل الجرعة الكاملة إلى المحقنة، وجّه طرف المحقنة لأعلى وأزل جميع فقاعات الهواء عن طريق التربيت برفق بإصبعك على المحقنة. ثم ادفع المكبس ببطء لتفريغ أي هواء متبقٍ.

ز



أزل إبرة الشفط من المحقنة، وبدلاً من ذلك قم بتوصيل إبرة الإعطاء تحت الجلد بمحقنة **HY**. ادفع المكبس ببطء لملء أنبوب إبرة الإعطاء تحت الجلد حتى أجنحة الإبرة.

*هذه هي أحجام المحاقن الموصى بها

3

الخطوة 3


# تحضير IG

أ




امسح السدادة المطاطية لكل قارورة **IG** بمسحة كحول واتركها تجف في الهواء لمدة 30 ثانية على الأقل.

ب




أدخل مثقب أنبوب المضخة في سدّادة قارورة/قوارير **IG**.*
اقلب القارورة/القوارير بحيث يكون الغطاء إلى الأسفل. علّق القارورة/القوارير على عمود أو خطّاف تعليق. قم بتوصيل أنبوب التسريب بالمضخة.

ج



املأ أنابيب المضخة بـ **IG** وفقًا لتعليمات الفريق الطبي.

د



حدد برنامج التسريب وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للمضخة ومعدل التسريب الموصوف لك.


* إذا كانت هناك حاجة إلى أكثر من قارورة واحدة لكل جرعة كاملة، فاثقب القوارير الإضافية فقط بعد اكتمال تسريب محتوى القارورة الأولى بالكامل.

4

الخطوة 4


# تسريب هيكيوفيا

* تذكّر أخذ HY قبل IG





حدد موضعًا ترغب في إجراء التسريب فيه في المنطقة الجانبية من البطن (مع الابتعاد عن السرة مسافة 4-5 سم) أو في الفخذ.
تجنب المناطق القريبة من العظم (حيث يكون العظم ملحوظًا جدًا)، أو المناطق التي تحتوي على أوعية دموية مرئية، أو شامات، أو ندبات، أو التهاب، أو عدوى. مع كل تسريب، بدّل بين المواضع لإتاحة الفرصة للمنطقة التي استخدمتها في التسريب السابق للتعافي.

* نظف موقع/مواقع التسريب بمسحة كحول.
اتركه ليجف في الهواء لمدة 30 ثانية على الأقل.





انزع غطاء إبرة الإعطاء تحت الجلد. اقرص طية جلد بمقدار لا يقل عن 2.0 سم ولا يزيد على 2.5 سم. أدخل الإبرة بالكامل حتى أجنحة الإبرة بحركة سريعة ومستقيمة في الجلد بزاوية 90 درجة. يجب أن تكون أجنحة الإبرة مفرودة على الجلد. ثبت الإبرة في مكانها بضمادة لاصقة معقمة.





كرر الخطوات من أ إلى ج إذا كان لديك موضع تسريب ثانٍ أو ثالث.


تحقق من أن موضع الإبرة صحيح قبل أن تبدأ التسريب، كما وجّهك الطاقم الطبي.





ادفع مكبس المحقنة التي تحتوي على **HY** ببطء بمعدل تسريب أولي يتراوح من 1 إلى 2 مل تقريبًا في الدقيقة، ثم زد المعدل وفقًا للتحمل.
إذا تم استخدام أكثر من موضع تسريب واحد، فاستشر ممرضة/مقدم رعاية حول كيفية إجراء التسريب.




بعد إدخال كامل HY، افصل المحقنة عن أنبوب إبرة الإعطاء تحت الجلد، ثم صِل طرف أنبوب إبرة الإعطاء تحت الجلد بأنبوب المضخة.
لا تنزع إبرة الإعطاء تحت الجلد.
**انتظر 10 دقائق قبل البدء بتسريب IG.**




بعد الانتظار، قم بتشغيل المضخة لإجراء تسريب IG بالمعدل/الخطة التي يحددها الطبيب المعالج.





عندما تكون القارورة فارغة، من الضروري الانتقال إلى القارورة التالية. لهذا الغرض: أوقف المضخة مؤقتًا. أخرج مُثقب أنبوب المضخة من القارورة الفارغة وأدخله في قارورة IG المعقمة التالية (كما فعلت في المرة الأولى). ثم أعد تشغيل المضخة. كرر العملية لكل قارورة من قوارير **IG** المتبقية.


بالنسبة للمرضى الذين **يقل** وزنهم عن 40 كجم، اختر مواقع على جانبين متقابلين من الجسم إذا طُلب منك التسريب في موقعين عندما تتجاوز الجرعة 300 مل.
بالنسبة للمرضى الذين يزيد وزنهم **عن** 40 كجم، اختر مواقع على جانبين متقابلين من الجسم إذا طُلب منك التسريب في موقعين عندما تتجاوز الجرعة 600 مل.

الخطوة 5


# الإنـهاء





بمجرد إفراغ آخر قارورة من الغلوبولين المناعي، أوقف المضخة مؤقتاً، وأزل قارورة الغلوبولين المناعي وقم بتوصيل كيس تسريب من محلول ملحي (saline) بأنابيب المضخة لإدخال ما تبقى من IG في أنبوب التسريب.




أعد تشغيل المضخة لشطف IG حتى أجنحة الإبرة. (ستتوقف المضخة تلقائياً عند الانتهاء من شطف أنبوب المضخة وأنبوب إبرة الإعطاء تحت الجلد).




قم بإيقاف تشغيل المضخة وافصل الأنابيب عن المضخة.





أزل مجموعة الإبرة عن طريق فكّ الضمادة من جميع الأطراف.
اسحب جناحي الإبرة إلى أعلى وإلى الخارج بشكل مستقيم. اضغط برفق بقطعة صغيرة من الشاش على موضع إدخال الإبرة وقم بتغطيته بضمادة واقية.




تخلّص من الكمية المتبقية من المستحضر في القارورة، وكذلك الأدوات أحادية الاستخدام، في حاوية التخلّص من الأدوات الحادة وفقًا لما أوصى به أخصائي الرعاية الصحية.




سجّل تفاصيل التسريب في سجل العلاج الخاص بك.




استمر في المتابعة مع الطبيب المعالج وفقاً لتعليماته.

## كيف يبدو الجسم بعد تسريب هيكيوفيا؟

بعد تسريب **هيكيوفيا**، قد تشعر بتورم في موضع التسريب. قد يستمر التورم لعدة أيام.

### قبل وأثناء وبعد العلاج بهيكيوفيا

مثال لمريض تلقى **هيكيوفيا** .قد يتفاعل جسمك مع تسريب **هيكيوفيا** بنفس الطريقة، أو بطريقة مختلفة.



قبل تسريب هيكيوفيا



مباشرةً بعد تسريب هيكيوفيا.
**في الحالة الموضحة، تلقى المريض حجماً قدره 235 مل من هيكيوفيا.**



24 ساعة بعد التسريب

# ما الآثار الجانبية المحتملة* لعلاج HyQvia؟

تحدث ردود فعل موضعية في موضع التسريب. *عادةً* ما تزول ردود الفعل هذه في غضون أيام قليلة.

**لم تتم ملاحظة أي تغيرات طويلة الأمد (مزمنة) في الجلد في الدراسات السريرية.**
**يجب إبلاغ الطبيب المعالج عن أي التهاب يستمر لفترة طويلة، أو تورمات (تكتلات) أو التهابات في موضع التسريب تستمر لأكثر من بضعة أيام.**

لا تقتصر الآثار الجانبية العامة على موضع التسريب وقد تحدث في جميع أنحاء الجسم.

## ردود فعل تحسسية

قد تسبب عمليات تسريب أدوية مثل هيكيوفيا ردود فعل تحسسية خطيرة لكنّها نادرة.
قد تعاني من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وفي حالات نادرة، صدمة تأقية.
يدرك اختصاصيو الرعاية الصحية هذه الآثار الجانبية المحتملة وسيراقبونك أثناء عمليات التسريب الأولية وبعدها.

تشمل العلامات أو الأعراض المعتادة لردود الفعل التحسسية ما يلي: الشعور بالدوار، الدوخة، الإغماء، طفح جلدي ووخز، تورم الفم أو الحلق،
صعوبة في التنفس، أزيز، معدل ضربات قلب غير طبيعي، ألم في الصدر، زرقة الشفتين أو أطراف أصابع اليدين والقدمين، تشوش الرؤية.

أخبر طبيبك أو الممرضة على الفور إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات أثناء التسريب.

*** للاطلاع على القائمة الكاملة للآثار الجانبية، يُرجى الرجوع إلى نشرة العبوة.**

# التعامل مع الآثار الجانبية المحتملة لعلاج HyQvia

## الآثار الجانبية الموضعية

قد تحدث ردود الفعل الموضعية التالية في موضع الحقن، وعادةً ما تزول في غضون أيام قليلة. يجب عليك الاتصال بطبيبك المعالج لمعرفة أفضل طريقة لعلاج أي ظاهرة موضعية تزداد سوءًا أو تستمر لأكثر من بضعة أيام.

**انزعاج أو ألم أو احمرار في موضع التسريب عند إدخال إبرة الإعطاء تحت الجلد**
- انزع الإبرة - ربما تكون قد اخترقت عضلاتك
- إذا كان الألم شديدًا ولا يتلاشى عند نزع الإبرة، أو حدث الألم مع كل تسريب، فاتصل بطبيبك المعالج
- تحدّث إلى طبيبك المعالج أو إلى الصيدلية حول تغيير طول الإبرة، فقد تكون طويلةً جدًا بالنسبة لك.
- قد يختلف سُمك الأنسجة تحت الجلد لكل شخص حسب العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم وموضع التسريب.
- سجّل في مفكرتك أن موضع التسريب هذا قد لا يكون مناسبًا لك

**انزعاج أو ألم أو احمرار في موضع التسريب أثناء التسريب أو بعده**
- تحدث إلى طبيبك المعالج، فقد يبطئ التسريب أو يوقفه
- ضع قطعة قماش نظيفة ودافئة أو باردة، وفقًا لتوجيهات طبيبكم، على المنطقة المتهيجة لفترات زمنية قصيرة (لا تزيد عن 10 دقائق)
- تحدث إلى طبيبك المعالج حول الحساسية المحتملة للشريط اللاصق أو للضمادة، أو إمكانية استخدام مسكن ألم خفيف

**تورم في موضع التسريب أو حوله**
- بعد تسريب هيكيوفيا، قد يحدث تورم مؤقت بسبب حجم السوائل التي تم تسريبها
- ضع قطعة قماش نظيفة ودافئة لفترات قصيرة (لا تزيد عن 5 إلى 10 دقائق) على المنطقة المتورمة
- قد ينصحك طبيبك المعالج بالتجول أو تدليك المنطقة المتورمة برفق

**حكة أو طفح جلدي في موضع التسريب أو حوله**
- أبطئ أو أوقف التسريب
- ضع قطعة قماش نظيفة وباردة لفترات قصيرة (لا تزيد عن 10 دقائق) على المنطقة المصابة بالحكة
- عند استخدام إبرة الإعطاء تحت الجلد، تجنب تغطية الإبرة بقطرات هيكيوفيا
- تحدث مع طبيبك المعالج حول إمكانية استخدام مضادات الهيستامين، إذا كان ذلك موصى به

**إذا عانيت من حكة غير خاضعة للسيطرة أو طفح جلدي/تهيج، فأوقف التسريب على الفور واستشر الطبيب المعالج أو خدمات الطوارئ؛**
**قد تشير هذه العلامات إلى رد فعل تحسسي خطير.**

## الآثار الجانبية العامة (الجهازية)

الآثار الجانبية العامة التي تؤثر في الجسم بأكمله وليس في جزء معين. تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا ما يلي:

**الصداع**
- تحدّث مع طبيبك المعالج حول استخدام مسكن ألم دون وصفة طبية.
- إذا استمر الصداع أو تفاقم، فاتصل بطبيبك المعالج.

**التعب**
- بعد التسريب يجب الراحة.
- نَم مبكرًا في يوم التسريب

**الحمّى**
- تحدث إلى طبيبك المعالج حول استخدام دواء يُصرف دون وصفة طبية لخفض الحمى
- إذا استمرت الحمى أو تفاقمت، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لك

تظهر آثار جانبية أخرى بمعدل تكرار منخفض أو غير معروف، بالإضافة إلى معلومات إضافية في نشرة المستهلك الخاصة بهيكيوفيا، بما في ذلك ردود فعل تحسسية خطيرة لكنها نادرة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تعاني من آثار جانبية غير مدرجة في نشرة المستهلك الخاصة بهيكيوفيا.
تحدث إلى طبيبك المعالج إذا عانيت من أي آثار جانبية، خاصة تلك غير المدرجة في نشرة العبوة، أو الخطيرة، أو التي تستمر لأكثر من بضعة أيام.

**تنبيه: الاقتراحات المذكورة أعلاه ليست بديلًا عن تعليمات طبيبك المعالج.**
**يمكنكم الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً إلى عنوان البريد الإلكتروني**
**AE.ISR@Takeda.com,**
**وعن شكاوى الجودة إلى عنوان البريد الإلكتروني QA-IL@Takeda.com.**
**قد يساعد الإبلاغ عن الآثار الجانبية في توفير معلومات إضافية حول سلامة هذا الدواء.**

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالآثار الجانبية من خلال النقر على رابط "الإبلاغ عن الآثار الجانبية الناجمة عن العلاج بالعقار" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة الإلكتروني (www.health.gov.il) والذي يشير إلى النموذج الإلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية، أو من خلال زيارة الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

## مصادر معلومات للمريض ومقدم الرعاية
## المجتمعات ومنظمات الدعم تساعد في هذا الموضوع
## نقص المناعة الأولي (PID)

يُعد الانضمام إلى المجموعات المجتمعية ومنظمات المرضى طريقة أخرى للتحكم في نقص المناعة الأولي (PID) لديك.
قد تتمكن من الاستعانة بهذه المؤسسات.

**جمعية بابل كير | نقص المناعة الأولي | Israel**
**https://www.bubblecare.org.il/**

**المصدر المرجعي**

نشرة للمستهلك لهيكيوفيا، معتمدة من وزارة الصحة، يناير 2026
© حقوق الطبع والنشر لعام 2026 محفوظة لشركة تاكيدا إسرائيل المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
تُعد تاكيدا وشعار تاكيدا علامتين تجاريتين لشركة تاكيدا إسرائيل المحدودة. ويُستخدمان بموجب ترخيص.
HyQvia هي علامة تجارية مسجلة لشركة باكسيلتا (Baxalta) التي أصبحت الآن جزءًا من شركة تاكيدا وتظل مالكة التسجيل.
تمت الموافقة على هذا الكتيب ومحتواه من قبل وزارة الصحة في مايو 2026.
لنشرة المريض:

**Reference:**

**1.** HyQvia Israel Summary of Product Characteristics, January 2026.
**2.** CarepathRx. PATIENT EDUCATION HyQvia Continuous Subcutaneous Infusion Via CADD Solis Pump. **Available at:** carepathrxllc.com/wp-content/uploads/2021/06/30.-HYQVIA-Continuous-Subcutaneous-Infusion-via-CADD-Solis.pdf Accessed November 2021
**3.** National Prescribing Service Limited MEDICINEWISE. Consumer medicine information. Available at: https://www.nps.org.au/medicine-finder/hyqvia-solution-for-infusion Accessed November 2021

C-NPRMCDA/IL/HYQ/0001 APR 2026