بطاقة ألتوميريس للمريض

معلومات هامة عن السلامة للمرضى الذين يأخذون ألتوميريس (رافوليزوماب)

يمكن أن يؤدي دواء ألتوميريس إلى خفض قدرة جهازك المناعي على مكافحة العدوى، وخاصة عدوى المكورات السحانية، الأمر الذي يتطلب عناية طبية فورية.

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور أو طلب الرعاية الطبية الطارنة، ويفضل أن يكون ذلك في مركز رعاية طبية طارئة كبير:

- صداع مع غثیان أو قيء
 - صداع وحمى
- صداع مع تيبس الرقبة أو تيبس الظهر
 - حمی
 - حمى وطفح جلدي
 - تشوش
- آلام العضلات مع أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا
 - ساسية العينين للضوء



احصل على رعاية طبية طارئة على الفور إذا كان لديك أي من هذه العلامات أو الأعراض وأظهر هذه البطاقة.

احتفظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات أثناء العلاج ولمدة 8 أشهر بعد الجرعة الأخيرة من ألتوميريس. قد يستمر خطر الإصابة بعدوى المكورات السحائية لعدة أسابيع بعد تناول الجرعة الأخيرة من ألتوميريس.

معلومات لاختصاصى الرعاية الصحية

- تم وصف دواء التوميريس (رافوليزوماب) لهذا المريض، الذي يزيد من قابلية المريض للإصابة بعدوى المكورات السحانية (المكورة السحانية).
- يجب أن يتم تطعيم جميع المرضى قبل أسبوعين على الأقل من تلقي التوميريس.
 يجب على المرضى الذين يبدؤون العلاج به التوميريس بعد أقل من أسبو عين من
 تلقي لقاح المكورات السحائية أن يتلقوا المضادات الحيوية الوقائية المناسبة حتى
 أسبوعين بعد التطعيم.
- بجب على المرضى تلقي التطعيم وإعادة التطعيم وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية الحالية للتطعيم لاستخدام التطعيم.
- بمكن أن تصبّح عدوى المكورات السحائية مهددة للحياة أو قاتلة بسرعة إذا لم يتم التعرف عليها ومعالجتها في وقت مبكر.
 - قم بالتقييم فُورًا إذا كانُ هناكُ أَسْتَباهُ فَي الإصابة بالعدوى و عالجها بالمضادات الحيوية المناسبة إذا لزم الأمر.

لمزيد من المعلومات حول التوميريس، يرجى الرجوع إلى النشرة الطبية الكاملة المعتمدة في إسرائيل. في حالة وجود مخاوف تتعلق بالسلامة، اتصل على 255-250-1800-1

· اتصل بالطبيب الذي وصف لك الدواء (أدناه) في أقرب وقت ممكن.

أو على البريد الالكتروني: drugsafety@neopharmgroup.com					
					اسم المريض
المستشفى حيث تم العلاج					
اسم الطبيب					
رقم الهاتف					
تاريخ (تواريخ) النطعيم:					
			تاريخ بدء العلاج بـ ألتوميريس:		
معلومات عن التطعيم ضد المكورات السحانية:					
الوقاية بالمضادات الحيوية التي يتم تلقيها إذا تم البدء في استخدام التوميريس بعد أقل من أسبو عين من تلقي اللقاح	السلسلة الأساسية/الجرعة المعززة	التاريخ	رقم الجرعة	المجموعة المصلية للقاح	العلامة التجارية للقاح
☐ لا ينطبق ☐ نعم، تاريخ البدء:					
☐ لا ينطبق ☐ نعم، تاريخ البدء:					
☐ لا ينطبق ☐ نعم، تاريخ البدء:					
نُمت المصادقة على هذا المستند أخر مرة في يونيو 2025 من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية.					

UITOMIRIS

ALEXION